

POINSETTIA

Aleurodes

PRIMEVERES

Chenilles

Pucerons

Botrytis

GERANIUM

VU DANS LES
SERRES

Pâquerette

POINSETTIA

Aleurodes

Les « mouches blanches » sont présentes dans les cultures de poinsettias. Même si les cultures étaient plutôt saines en début de saison, on observe une installation des populations d'aleurodes. Les plus communes sont : *Trialeurodes vaporariorum* et *Bemisia tabaci*. L'auxiliaire *Encarsia formosa* est employé sous serre pour lutter contre les aleurodes. On utilise également les hyménoptères *Eretmocerus mundus*, ou *Eretmocerus eremicus* plus efficaces pour parasiter *Bemisia tabaci* qui est plus résistante aux pesticides. Les punaises comme *Macrolophus caliginosus* peuvent également représenter des agents de lutte importants.



Aleurodes adultes et puparium plein de Bemisia tabaci.
Photo Flhoreal

PRIMEVERES

Chenilles

Les populations de chenilles globalement diminuent dans les cultures.

Pucerons

Deux exploitations signalent des attaques de pucerons sur primevères.



Puceron et pucerons parasité
(Photo Flhoreal)

Botrytis

Le botrytis est présent dans de nombreuses exploitations. Les conditions climatiques humides favorisent son développement ; il est nécessaire de distancer les cultures pour favoriser l'aération entre les plants.



Botrytis en cultures de primevères. Photo Flhoreal

Les cas de botrytis sont rencontrés sur d'autres cultures tels que les pensées, les cyclamens...



Botrytis sur culture de cyclamen et de pensées
(Photo Flhoreal)

Le botrytis, encore appelé pourriture grise, peut contaminer un grand nombre d'espèces, c'est pourquoi, quand les conditions micro-climatiques sont favorables, on le retrouve sur un grand nombre de culture. Disséminé par l'eau et les courants d'air, il progresse rapidement à l'intérieur des plantes et fructifie abondamment.

GÉRANIUM

Pour ceux qui ont des géraniums, rien n'est à signaler pour le moment.

PAQUERETTE

Quelques cas de rouille sont signalés sur pâquerette. Attention car cette maladie peut se propager très rapidement. Les symptômes sont des pustules oranges vifs en cercle sur les faces supérieures des feuilles. Il est recommandé de jeter les plantes trop atteintes afin de limiter la propagation.



Rouille sur pâquerettes (Photo Flhoreal)

Bilan des cultures *Etat sanitaire correct*

Couple [plante/ravageur]		Risque
Poinsettia	Aleurodes	
Primevère	Chenilles	
	Botrytis	
Cyclamen	Botrytis	
Géranium	Thrips	

Légende

Aucun risque	
Risque moyen à surveiller	
Risque important	

Bulletin rédigé par FLHOREAL en collaboration avec Arexhor Grand Est, et édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture d'Alsace. Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles d'un réseau de parcelles suivies par ces partenaires : il donne une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture d'Alsace dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.