

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE

PRODUCTIONS HORTICOLES n° 8 du 16 juillet 2010



Le BSV Productions horticoles marque une pause estivale, permettant ainsi aux cultures de chrysanthèmes, cyclamens et poinsettias de croître jusqu'au prochain rendez-vous fixé au 27 août.

THRIPS sur chrysanthèmes : poursuivre la vigilance

Malgré les températures chaudes enregistrées sous les serres, seul un cas d'attaque de thrips sur chrysanthèmes a été signalé. Ils étaient bien cachés au cœur du feuillage. Cependant il ne faut pas relâcher la vigilance.

Autres ravageurs sur chrysanthèmes : aleurodes et pucerons

Aucune présence de pucerons ou d'aleurodes n'est à mentionner sur les cultures de chrysanthèmes menées en extérieur ou sous abris.

ROUILLE sur chrysanthèmes : aucun cas signalé

Le rempotage de boutures saines évite en grande partie la contamination ultérieure des pots en entreprise. A ce stade de la végétation, les chrysanthèmes sont sains.

Cyclamens et thrips, aleurodes, pucerons et chenilles : tous absents

Après en moyenne un mois de culture, aucun ravageur n'a été identifié dans les productions de cyclamens.

Fusariose sur cyclamens

Les jeunes plants de cyclamens sont très vraisemblablement traités contre la fusariose. La rémanence des fongicides utilisés est de l'ordre de quatre à cinq semaines alors il faudra redoubler de vigilance à partir de mi-août.



Rappel des symptômes :
de *Fusarium oxysporum*
sp. *Cylaminis*

Après un jaunissement des feuilles indiquant une chlorose, les feuilles flétrissent. Puis, les tissus de soutien de la tige perdent leur turgescence. En phase finale, une coupe du tubercule met en évidence le noircissement des vaisseaux

conducteurs suite à l'obstruction causée par la fusariose.



Photos AREXHOR.G.E.

BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque

LES CULTURES DE CHRYSANTHEMES ET DE CYCLAMENS SONT « PROPRES »

| Couple plante/ravageur | | Niveau de risque |
|------------------------|--------------|------------------|
| Ravageur | plante | |
| Aleurodes | chrysanthème | |
| Puceron | chrysanthème | |
| Rouille | chrysanthème | |
| Thrips | chrysanthème | |
| Aleurodes | cyclamen | |
| Fusariose | cyclamen | |
| Pucerons | cyclamen | |
| Thrips | cyclamen | |

| Légende | |
|---------------------------|--|
| Aucun risque | |
| Risque moyen à surveiller | |
| Risque important | |

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne et rédigé par AREXHOR Grand-Est, avec la collaboration du SRAL et de la FREDON Bourgogne, à partir des observations réalisées par ADHP.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'Agriculture de Bourgogne dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les horticulteurs et pépiniéristes pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.